

# Por qué tratar temprano con Mavenclad®


Pietro Annovazzi, MD

Unidad de Neurología del Hospital Gallarate, ASST Valle Olona. Gallarate, Italia

- Un reciente estudio de seguimiento que incluyó 56 centros de referencia en Italia reportó los resultados obtenidos en 236 pacientes que recibieron Mavenclad® luego de 24 meses. Los parámetros evaluados fueron la tasa anualizada de recaídas, la medida NEDA-3, la escala EDSS de discapacidad y el perfil de seguridad (incluyendo el recuento linfocitario cada 3 meses).
- Los resultados se agruparon según el uso previo de fármacos modificadores de enfermedad de primera o segunda línea. Luego de dos años de tratamiento, la medida NEDA-3 fue alcanzada por el 56.6 % del total de los pacientes; un subanálisis mostró que el 69% de quienes habían recibido Mavenclad® como terapia inicial había logrado la medida NEDA-3, lo cual confirma su mayor eficacia cuando el tratamiento se inicia de forma temprana.

## Estudio multicéntrico observacional en Italia. La medida NEDA fue alcanzada con más frecuencia en los pacientes que recibieron Mavenclad® de forma temprana

### Proporción de pacientes con medida NEDA durante el seguimiento según el estado previo de tratamiento (N=236)



La medida NEDA fue alcanzada con más frecuencia en pacientes sin terapia previa vs. quienes habían recibido una terapia de primera o segunda línea previamente (HR 2.8 [IC 95% 1.0-7.6];  $p=0.04$ ).

La medida NEDA en los primeros 12 meses predijo la medida NEDA del segundo año de tratamiento (HR 6.2 [IC 95% 2.5-15.1];  $p=0.0001$ ).

**El 56.6% (134/236) de los pacientes tratados con Mavenclad® alcanzó la medida NEDA en 2 años.**

Adaptado de Annovazzi P, et al. ECTRIMS 2021 [P842].

MERCK

## ECTRIMS 2022

Merck, S.A., 12 Avenida 0-33, Zona 2 de Mixco, Código Postal 01057, Ciudad de Guatemala. Material promocional destinado exclusivamente a profesionales de la salud facultados para prescribir y/o dispensar medicamentos de venta bajo receta. El material científico aquí referenciado se encuentra a su disposición, para solicitarlo comuníquese con el al Departamento Médico de Merck por mail a SIM@merckgroup.com. Prohibida la reproducción total o parcial sin expreso consentimiento de Merck.

CT-MAV-00132



Revista de divulgación científica, de distribución gratuita y dirigida a profesionales de la salud. Resumen elaborado por el staff de Circle Press.

Los datos y resultados presentados en este material se obtuvieron de una conferencia médica, y la información resumida puede ser preliminar y estar sujeta a cambios. Estos datos se incluyen solo para la capacitación del médico y la información tiene fines exclusivamente educativos. Las opiniones de este artículo pertenecen a los autores y conferencistas, y no reflejan recomendaciones o sugerencias del laboratorio patrocinante.



**MAVENCLAD®**  
cladribina comprimidos

INNOVADORAMENTE SIMPLE